No. 12 Gangrène de cause interne. Lidian

Le 13 avril 1743 un ouvrier (agé de 30 ans) d'un temperament fort sec, sentit au bout du doigt du milieu de la main droite une douleur brulante, et s'apercût en même temps, que ce doigt étoit de couleur de lie de vin. Le lendemain il y trouva une vessie noire qu'il coupa avec des ciseaux, et il en sortit quelques gouttes d'un sang noir, partie coagulé partie séreux. La douleur continua malgré des cataplasmes anodins qu'il y mit. Une fievre legere qui avoit commencé avec la maladie du doigt, augmenta avec de grands redoublemens irréguliers et des defaillances, ce qui dura 4 a 5 jours. Cet homme étoit alors a 20 lieuës de paris, et le chirurgien

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
32
3/10
AC, 21 d. 1 n° 1

du lieu ~~et~~ luy fit pendant 3 semaines bien des remedes comme saignées fomentations, ~~cataplasmes~~ application de styrax, d'Eau de vie camphrée. Pendant ce temps le mal du bout du doigt s'etendit a tout le doigt et a la paulme de la main dans laquelle il se fit encor une grande phlictaine remplie de sang dissout et noir. cela engagea le malade a venir a paris, et il eut recours a moy.

La fievre subsistoit avec des redoublem[ens] irreguliers, mais assez legers. Je trouvay le doigt du milieu entiérement sphacelé et le sphacele se continuoit a presque toute la paulme de la main; je dis presque, parce qu'elle avoit respecté le muscle thenar. Le doigt annulaire

étoit bouffi et livide dans toute la
circonference, et sembloit ne tenir à rien,
car on pouvoit le renverser ~~presque~~
jusque sur le dos de la main. Tout le
dessus de la main étoit pareillement bouffi
et livide, et il s'y étoit fait en plusieurs
endroits des crevasses à la peau par lesquelles
il suintoit des sérosités puantes. En un
mot, il paroissoit que toutte la main étoit sans ressource
et qu'il n'y avoit rien à faire qu'à la couper.
Et tout ce qui avoit précédé, et à l'état
présent de la partie, il ~~ne me fut pas~~
~~difficile de reconnoître~~ ~~la c~~ une gangrene
de cause interne qui pouvoit avoir ~~pour~~ un principe
un vice scorbutique, et j'agis en conséquence.

J'ôtai d'abord le doigt du milieu à
l'endroit de son articulation avec l'os du
métacarpe, et je fis au doigt annulaire
des scarifications dans toute sa circon-
férence. J'emportai autant qu'il me fut

possible, tout ce qui étoit sphacellé
dans la paulme de la main, et je fis
sur le dos de la main plusieurs scarrifications d'on il sortit assez de sang
noir.

Cela fait j'emplis toutes les playes, de charpie pour arrester le sang qui ruisseloit; mais comme il falloit mettre au plustost le tout en supuration, et prévenir le progrès de la gangréne, j'ostay cet appareil au bout d'une heure, et je pançay le tout avec l'unguent de styrax un peu détrempé avec l'huile d'yppericum, le tout couvert de compresses imbibées d'Eau de vie camphrée.

Quoy que la fiévre n'eut aucuns accès réglés je fis prendre au malade dès le jour mesme 4 prises de quinquina

en bolus a la dose de 2 scrupules, et comme j'avois lieu de soubçonner une cause scorbutique, je luy fis prendre soir et matin un bouillon avec le veau, le cresson de fontaine, le coclearia et le cerfeuil. Il a continué l'usage du quinquina et des ces bouillons pendant un mois.

La fievre se calma le troisieme jour, et dès le 4e les playes commencerent ~~a~~ a prendre un air ~~vivant~~ de vie, qui donnoit lieu de penser que la gangrène etoit bornée. Au 8e jour les playes se trouverent tres vives a la reserve de plusieurs portions d'escarres formés par le pannicule graisseux, par quelques uns des tendons flechisseurs, et par une portion de l'expansion du palmaire qui tenoit au ligament annulaire,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

sur les quelles escarres je me servois
de l'esprit de therebentine pour
achever de les faire detacher. En
mesme temps le doigt annulaire et
le dos de la main se degonflerent et
reprirent vie, de maniere que les playes
que j'y avois faites se mundifierent
et se guerirent en moins de 15 jours.

La playe de la paulme de la main
fut bien plus longtemps; car il tomba
nombre des darres de dessous la peau
a toute la circonference de la playe.
Cependant elle fut mondifiée au bout
d'un mois et la cicatrice s'avançant
peu a peu de la circonference, elle
gaigna le centre.

A la chute des escarres, la moitié
de l'os du métacarpe qui ~~soutient~~ avoit soutenu

le doigt du milieu, que j'avoit coupé, se trouva
decouvert, et cette portion me parut
comme morte et a demy déséchée;
La nature ayant si bien repondu a nos soins,
je crus qu'elle pourroit detacher le
mort du vif, et effectivement elle se
fit, mais ce ne fut qu'au bout de
5 a 6 mois, et peu de jours après,
la playe se trouva entierement guerie.
ce 20 7bre 1744 Le Dran

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

observation de mr. ledran a remise
au comité pour etre approuvée